



Rémunération sur objectifs de santé publique Résultats à fin 2012 et bilan

CPN du 11 avril 2013

La ROSP un an après

- L'ensemble des médecins rémunérés (75 444) perçoivent en moyenne chacun 3 746 € .
- Les généralistes (hors MEP, soit 50 584) rémunérés perçoivent en moyenne 4 982 €, ils ont atteint un taux de réalisation des objectifs (bloc organisation et bloc clinique) de 50 %.
- Un mouvement de modernisation de la médecine : 80 % des omnipraticiens sont éligibles à une rémunération du bloc organisation, 73 % pour l'ensemble des médecins.
- Un bilan présenté sans les montants calculés pour les cardiologues dont la première rémunération sera versée au cours du mois de mai 2013

L'organisation du cabinet et la qualité de service

Part des médecins ayant le pré requis au bloc organisation du cabinet
(Médecins éligibles actifs, conventionnés)

		Tous médecins		Omnipraticiens		Spécialistes	
Taux de FSE >= à 2/3	CdC SESAME- VITALE >= 1.40 2bis	Nb de PS	%	Nb de PS	%	Nb de PS	%
oui	oui	78 244	73%	47 768	79%	30 476	66%
oui	non	8 548	8%	4 587	8%	3 961	9%
non	oui	4 531	4%	2 311	4%	2 220	5%
non	non	15 330	14%	6 064	10%	9 266	20%
Total		106 653	100%	60 730	100%	45 923	100%

Part des médecins dont l'indicateur est retenu pour les médecins ayant le pré requis
(version de Cdc + taux de FSE $\geq 2/3$)

Indicateur	Retenu	tous médecins		Omnipraticiens		Spécialistes	
		Nb de PS	%	Nb de PS	%	Nb de PS	%
Logiciel Métier	Non	29 968	38%	12 873	27%	17 095	56%
	Oui	48 276	62%	34 895	73%	13 381	44%
	Total	78 244	100%	47 768	100%	30 476	100%
LAP	Non	40 488	52%	17 218	36%	23 270	76%
	Oui	37 756	48%	30 550	64%	7 206	24%
	Total	78 244	100%	47 768	100%	30 476	100%
TLS	Non	40 990	52%	15 982	33%	25 008	82%
	Oui	37 254	48%	31 786	67%	5 468	18%
	Total	78 244	100%	47 768	100%	30 476	100%
Horaires	Non	19 885	25%	6 433	13%	13 452	44%
	Oui	58 359	75%	41 335	87%	17 024	56%
	Total	78 244	100%	47 768	100%	30 476	100%
Synthese	Non	39 934	51%	13 803	29%	26 131	86%
	Oui	38 310	49%	33 965	71%	4 345	14%
	Total	78 244	100%	47 768	100%	30 476	100%

Pratique clinique : suivi des pathologies chroniques

Moyennes pondérées (par la patientèle ou le nb de boîtes) pour les médecins éligibles, actifs et conventionnés

Le suivi des pathologies chroniques	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2012	Évolution en points Déc 2012 - Déc 2011	Évolution en pourcentage Déc 2012 - Déc 2011
HbA1c	Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages de l'hémoglobine glyquée dans l'année	>= 65 %	45,9%	48,7%	2,7	6%
suivi ophtalmologique	Part des patients diabétiques ayant eu une consultation d'ophtalmologie ou un examen du fond d'oeil dans les deux dernières années	>= 80 %	61,3%	61,5%	0,1	0%
diabétiques à haut risque cardiovasculaire sous statines	Part des patients diabétiques (hommes de plus de 50 ans et femmes de plus de 60 ans) traités par antihypertenseurs qui ont bénéficié d'un traitement par statine	>= 75 %	58,3%	59,9%	1,7	3%
diabétiques à haut risque cardiovasculaire sous statines et aspirine faible dose	Part des patients diabétiques (hommes de plus de 50 ans et femmes de plus de 60 ans) traités par antihypertenseurs et statines qui ont bénéficié d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant	>= 65%	51,6%	53,5%	1,9	4%

Prévention

Moyennes pondérées (par la patientèle ou le nb de boîtes) pour les médecins éligibles, actifs et conventionnés

La prévention	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2012	Évolution en points Déc 2012 - Déc 2011	Évolution en pourcentage Déc 2012 - Déc 2011
grippe 65 ans et +	Part des patients 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière	>= 75 %	57,8%	56,4%	-1,4	-2%
grippe 16-64 ans hors ALD	Part des patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne et vaccinés contre la grippe saisonnière	>= 75 %	35,4%	35,0%	-0,5	-1%
cancer du sein	Part des patientes de 50 à 74 ans ayant bénéficié d'une mammographie dans les deux dernières années	>= 80 %	64,9%	64,8%	-0,1	0%
cancer du col de l'utérus	Part des patientes de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des trois dernières années	>= 80 %	58,7%	57,5%	-1,2	-2%
vasodilatateurs	Part des patients de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs dans l'année	<= 5%	10,6%	7,1%	-3,5	-33%
benzodiazépines à demi-vie longue	Part des patients de plus de 65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie longue dans l'année	<= 5%	13,7%	12,1%	-1,6	-11%
durée de traitement par benzodiazépines	Part des patients ayant débuté un traitement par benzodiazépines et dont la durée de traitement est supérieure à 12 semaines	<= 12%	15,0%	15,9%	0,9	6%
antibiothérapie	Nombre de prescriptions d'antibiotiques réalisées pour 100 patients âgés de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année	<= 37	45,7	44,3	-1,4	-3%


Optimisation des prescriptions/efficience

Moyennes pondérées (par la patientèle ou le nb de boîtes) pour les médecins éligibles, actifs et conventionnés



L'efficience	Indicateurs	Objectifs cibles	Résultats à fin décembre 2011	Résultats à fin décembre 2012	Évolution en points Déc 2012 - Déc 2011	Évolution en pourcentage Déc 2012 - Déc 2011
antibiotiques	Part de prescriptions d'antibiotiques réalisées sur les molécules disposant d'un générique (en nombre de boîtes) sur les 12 derniers mois	$\geq 90 \%$	78,6%	80,9%	2,3	3%
IPP	Part de prescriptions d'IPP réalisées sur les molécules disposant d'un générique (en nombre de boîtes) sur les 12 derniers mois	$\geq 85 \%$	71,3%	83,1%	11,8	17%
statines	Part de prescriptions de statines réalisées sur les molécules disposant d'un générique (en nombre de boîtes) sur les 12 derniers mois	$\geq 70 \%$	38,2%	53,8%	15,6	41%
antihypertenseurs	Part de prescriptions d'antihypertenseurs réalisées sur les molécules disposant d'un générique (en nombre de boîtes) sur les 12 derniers mois	$\geq 65 \%$	64,1%	72,6%	8,5	13%
antidépresseurs	Part de prescriptions d'antidépresseurs réalisées sur les molécules disposant d'un générique (en nombre de boîtes) sur les 12 derniers mois	$\geq 80 \%$	66,0%	66,5%	0,5	1%
IEC-sartans	Part des inhibiteurs d'enzyme de conversion (IEC) sur l'ensemble des prescriptions d'IEC et de sartans (en nombre de boîtes)	$\geq 65 \%$	39,4%	39,6%	0,1	0%
AAP	Part des patients traités par aspirine à faible dosage parmi les patients traités par antiagrégants plaquettaires	$\geq 85 \%$	82,0%	83,3%	1,3	2%

Diabète : dosages d'HbA1c



Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HbA1c dans l'année



Diabète : dosages d'HbA1c




Diabète : dosages d'HbA1c





Benzodiazépine à $\frac{1}{2}$ vie longue chez les patients de plus de 65 ans



Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie longue




Benzodiazépine à ½ vie longue chez les patients de plus de 65 ans



Benzodiazépine à ½ vie longue chez les patients de plus de 65 ans




Nombre de prescriptions d'antibiotique pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD



Nombre de prescriptions d'antibiotique pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD


Nb de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)

Données à fin décembre 2011



Nb de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)


Données à fin décembre 2012



Nombre de prescriptions d'antibiotique pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD

Nb de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)


Données à fin décembre 2012



Source : SNIIRAM

Nb de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)

Données à fin décembre 2012



Source : SNIIRAM