

AGE	VACCINS	REMARQUES	PRODUITS COMMERCIAUX DISPONIBLES CORRESPONDANTS
Naissance	BCG	si milieu à risque ou collectivités	Vaccin BCG SSI (ID)
2 mois	DTPCH HB(1) Pn	DTCPH+HB éventuellement* pneumocoque heptavalent	Pentavac, Infanrixquinta HB Vax PRO 5, Engerix B 10, GenHevac B, Infanrixhexa Prevenar
3 mois	DTPCH Pn	pneumocoque heptavalent	Pentavac, Infanrixquinta Prevenar
4 mois	DTPCH HB(2) Pn	DTCPH+HB éventuellement* pneumocoque heptavalent	Pentavac, Infanrixquinta HB Vax PRO 5, Engerix B 10, GenHevac B, Infanrixhexa Prevenar
9 mois	ROR	si collectivités	ROR Vax, Priorix
12 mois	ROR (1) Pn	1ère injection pneumocoque heptavalent	ROR Vax, Priorix Prevenar
13-24 mois	ROR (2)	2ème injection	ROR Vax, Priorix
16-18 mois	DTPCH HB(3)	si DTCPH+HB* fait à 2 et 4 mois	Pentavac, Infanrixquinta HB Vax PRO 5, Engerix B 10, GenHevac B, Infanrixhexa
< 6 ans 6 ans	BCG DTP ROR	si < 2 inj. avant	Vaccin BCG Pasteur DT Polio, Revaxis ROR Vax, Priorix
11-13 ans	DTPC ROR HB	si < 2 inj. Avant si non pratiquée avant : 3 injections	Tetravac, Infanrixtetra, Repevax, Boostrixtetra ROR Vax, Priorix HB Vax PRO 5, Engerix B 10, GenHevac B
16-18 ans	dTP ROR	1 injection si non pratiquée avant	Revaxis ROR Vax, Priorix
18-25 ans	dTP ROR	1 injection si non pratiquée avant	Revaxis ROR Vax, Priorix
> 25 ans	dTP Rubéole	tous les 10 ans F <45 ans non vaccinée avant	Revaxis Rudivax
> 65 ans	dTP G	tous les 10 ans annuellement	Revaxis Agrippal, Fluarix, Fluvirine, Immugrip, Influvac, Mutagrip, Previgrip, Vaxigrip