

# Aide mémoire sur la vaccination antigrippale

## Stratégie vaccinale contre la grippe pour la saison 2012-2013

La grippe est une infection respiratoire aiguë, souvent considérée comme bénigne, dont l'évolution peut être compliquée en raison d'une virulence particulière du virus ou à cause de la fragilité des personnes infectées.

La vaccination est la principale mesure de prévention de la grippe. La politique vaccinale vise à protéger les personnes pour lesquelles la grippe peut être grave. Pour ces personnes, l'objectif est avant tout de réduire le risque de décès et de complications en cas de grippe.

La liste des pathologies sous-jacentes ciblées par les recommandations vaccinales a été revue par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en 2011.

En 2012, ces recommandations vaccinales ont été actualisées et prennent désormais en compte les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse et les personnes obèses ayant un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40kg/m<sup>2</sup>.

Les recommandations de vaccination antigrippale peuvent évoluer en fonction des données épidémiologiques et faire ainsi l'objet d'une actualisation non incluse dans le calendrier en vigueur.

### En synthèse : Nouveautés du calendrier vaccinal 2012

Dans son avis du 16 février 2012\*, le Haut conseil de la santé publique recommande désormais que soient également vaccinées contre la grippe saisonnière :

- **Les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse**
- **Les personnes obèses avec un indice de masse corporelle égal ou supérieur ou à 40 kg/m<sup>2</sup>**

\* relatif à l'actualisation de la vaccination contre la grippe saisonnière dans certaines populations (femmes enceintes et obèses). (Avis et rapport disponibles sur [www.hcsp.fr](http://www.hcsp.fr))

## Les vaccins contre la grippe saisonnière

Les vaccins contre la grippe saisonnière sont des vaccins trivalents inactivés, sans adjuvant, qui contiennent les antigènes des trois virus grippaux les plus susceptibles de circuler cette saison : deux souches de virus A [A(H1N1) et A(H3N2)] et une souche de virus B. La composition déterminée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la saison 2012-2013 dans l'hémisphère Nord diffère du vaccin 2011/2012 pour les souches A(H3N2) et B :

- A/California/7/2009 (H1N1), identique à la saison 2011/12
- A/Victoria/361/2011 (H3N2), nouvelle par rapport à la saison 2011/12
- B/Wisconsin/1/2010, nouvelle par rapport à la saison 2011/12

Les vaccins classiques contre la grippe saisonnière disponibles en pharmacie d'officine en France sont :

**AGRIPPAL**® (Novartis Vaccines), **FLUARIX**® (GSK), **IMMUGRIP**® (Pierre Fabre)

**INFLUVAC**® (Abbott), **VAXIGRIP**® (Sanofi Pasteur MSD).

Le vaccin est administré par voie intra musculaire aux doses suivantes :

Age	Dose	Nombre de doses
De 6 à 35 mois	0,25 ml	1 ou 2*
De 3 à 8 ans	0,5 ml	1 ou 2*
A partir de 9 ans	0,5 ml	1

\* Deux doses à un mois d'intervalle en primo vaccination. Une dose en rappel annuel.

## Sites Internet à consulter pour plus d'informations

Ministère des affaires sociales et de la santé :  
[www.sante.gouv.fr](http://www.sante.gouv.fr), dossier grippe saisonnière

Institut de veille sanitaire (InVS) : [www.invs.sante.fr](http://www.invs.sante.fr)

Haut Conseil de la santé publique : [www.hcsp.fr](http://www.hcsp.fr),  
rubrique avis et rapports

Assurance maladie : [www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html](http://www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html)

# Aide mémoire sur la vaccination antigrippale

## Recommandations du calendrier vaccinal 2012\*

### Recommandations générales

- Personnes âgées de 65 ans et plus

### Recommandations particulières

- Femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse

- Personnes, y compris les enfants à partir de l'âge de 6 mois, atteintes des **pathologies suivantes** :

- Affections broncho pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 (asthme et BPCO)
- Insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique
- Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont asthme, bronchite chronique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique
- Dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques)
- Mucoviscidose
- Cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque
- Insuffisances cardiaques graves
- Valvulopathies graves
- Troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours
- Maladies des coronaires
- Antécédents d'accident vasculaire cérébral
- Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot)
- Paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique
- Néphropathies chroniques graves
- Syndromes néphrotiques
- Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalassodrépanocytose
- Diabète de type 1 et de type 2
- Déficiences immunitaires primitifs ou acquis (pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d'organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficiences immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto immunes recevant un traitement immunosuppresseur), excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines ; personnes infectées par le VIH quel que soit leur âge et leur statut immunovirologique

- Personnes **obèses avec un IMC égal ou supérieur à 40 kg/m<sup>2</sup>**, sans pathologie associée ou atteintes d'une pathologie autre que celles citées ci-dessus

- Personnes **séjournant dans un établissement de soins** de suite ainsi que dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge

- **Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois** (résidant sous le même toit, la nourrice et les contacts réguliers du nourrisson) présentant des **facteurs de risque de grippe grave** ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire ou d'une affection longue durée (cf. supra)

### En milieu professionnel

- Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère
- Personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs (guides)

\*Calendrier vaccinal 2012 (BEH du 10 avril 2012) :

[http://www.invs.sante.fr/content/download/34308/169293/version/3/file/beh\\_14\\_15.pdf](http://www.invs.sante.fr/content/download/34308/169293/version/3/file/beh_14_15.pdf)

