

Fiche descriptive de l'indicateur : <b>Hydratation dans les 24 premières heures            du syndrome de sevrage</b>	
<b>Définition</b>	Proportion de patients ayant fait un sevrage de l'alcool durant leur hospitalisation pour lesquels la prescription ou l'administration d'une hydratation est retrouvée dans le dossier dans les 24h suivant le début du syndrome de sevrage
<b>Numérateur</b>	Nombre de dossiers dans lesquels est retrouvée, dans les 24h suivant le début du syndrome de sevrage : - La prescription d'une hydratation Ou - L'administration d'une hydratation Ou - La trace d'un risque ou d'un état d'hyperhydratation
<b>Dénominateur</b>	Nombre de dossiers inclus
<b>Critères d'exclusion</b>	-
<b>Type d'indicateur</b>	Indicateur de processus.
<b>Recommandations</b>	<p>« Il existe une déshydratation quasi systématique chez les dépendants de l'alcool ainsi que des perturbations de la sensation de soif qui justifient la stimulation de l'hydratation et la mesure des quantités consommées. » - Vabret F. Modalités du sevrage alcoolique. La revue du praticien. 2006;56:1093-7</p> <p>« Les apports hydriques doivent être suffisants mais sans hyperhydratation qui peut être nocive. Les perfusions sont à éviter chez le malade conscient. L'hydratation doit être orale chez le malade conscient. » - ANAES&amp;SFA. Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolo-dépendant. Conférence de consensus. Paris: Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé &amp; Société française d'alcoologie; 1999 17 mars</p> <p>Pour la SFA en 2006, ces apports doivent être suffisants (1,5 à 2 litres par jour) (8). - SFA. Sevrages non-programmés: Accidents de sevrage. Evaluation des pratiques professionnelles en alcoologie: Référentiel de bonnes pratiques cliniques. Paris: Société française d'alcoologie; 2006 Décembre.</p>
<b>MODE D'EVALUATION DE L'INDICATEUR</b>	
Recueil rétrospectif sur dossier Pour chaque dossier est recherché l'ensemble des éléments demandés dans le dossier. L'indicateur est la moyenne des dossiers.	

### Algorithme de calcul

Proportion de patients ayant fait un sevrage de l'alcool durant leur hospitalisation pour lesquels la prescription ou l'administration de l'hydratation est retrouvée dans le dossier dans les 24h suivant le début du syndrome de sevrage.

Variable	Algorithme	
<p style="text-align: center;">Pourcentage de dossiers =</p> $\sum_{i=1}^{60} [\text{num IND HYDRA}] / \sum_{i=1}^{60} [\text{den IND HYDRA}]$	<p>Dossier i :</p> <p>[num IND HYDRA]</p>	<p>Si [HYDRA 1] = « Oui »            Ou [HYDRA 2] = « Oui »            Ou [HYDRA 3] = « Oui »            Alors                [num IND HYDRA] = 1            Sinon                [num IND HYDRA] = 0            FinSi</p>
	<p>Dossier i :</p> <p>[den IND HYDRA]</p>	<p>Si [SAD 9]= « Retrouvé »            Alors                [den IND HYDRA] = 1            FinSi</p>