

Fiche descriptive de l'indicateur : Information sur l'arrêt du tabac	
<b>Définition</b>	Proportion de patients fumeurs ayant fait un sevrage de l'alcool durant leur hospitalisation pour lesquels est retrouvée dans le dossier la trace d'une information ou d'un conseil sur l'arrêt du tabac.
<b>Numérateur</b>	Nombre de dossiers dans lesquels est retrouvée la trace d'une information ou d'un conseil sur l'arrêt du tabac
<b>Dénominateur</b>	Nombre de dossiers de patients fumeurs inclus
<b>Critères d'exclusion</b>	-
<b>Type d'indicateur</b>	Indicateur de processus.
<b>Recommandations</b>	« 80 à 95% des malades de l'alcool sont également des fumeurs. [...] Aujourd'hui, alcoologues et malades semblent accorder un intérêt croissant au sevrage alcoolique couplé au sevrage tabagique. Il existe des arguments en faveur de ce sevrage simultané qui convient aux patients les plus motivés : l'arrêt de l'alcool produit sédatif et la poursuite de la consommation de tabac produit stimulant pourraient entraîner une rupture d'équilibre avec accroissement du besoin du premier.[...] Au vu des connaissances actuelles, le jury recommande de proposer le sevrage simultané dès que la motivation des patients le permet, ce qui nécessite d'aborder d'emblée l'information sur le tabac et les modalités du sevrage tabagique. » - ANAES&SFA. Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoololo-dépendant. Conférence de consensus. Paris: Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé & Société française d'alcoologie; 1999 17 mars
MODE D'EVALUATION DE L'INDICATEUR	
Recueil rétrospectif sur dossier	
Pour chaque dossier est recherché l'ensemble des éléments demandés dans le dossier. L'indicateur est la moyenne des dossiers.	
Algorithme de calcul	
Proportion de patients fumeurs ayant fait un sevrage de l'alcool durant leur hospitalisation pour lesquels est retrouvée dans le dossier la trace d'une information ou d'un conseil sur l'arrêt du tabac.	
<i>*Est considéré comme patient fumeur, une trace dans le dossier indiquant que le patient consomme régulièrement ou est dépendant du tabac.</i>	
Variable	Algorithme
Pourcentage de dossiers = $\sum_{i=1}^{60} [\text{num IND TABAC}] / \sum_{i=1}^{60} [\text{den IND TABAC}]$	Dossier i : [num IND TABAC] Si [TABAC 3] = « Oui » Alors [num IND TABAC] = 1 Sinon [num IND TABAC] = 0 FinSi
	Dossier i : [den IND TABAC] Si [TABAC 2] = « Oui » Alors [den IND TABAC] = 1 FinSi

Fiche descriptive de l'indicateur : <b>Suivi du traitement par benzodiazépines</b>	
<b>Définition</b>	Proportion de patients ayant fait un sevrage de l'alcool durant leur hospitalisation pour lesquels lorsque le traitement de sortie comporte des benzodiazépines (BZD), la posologie et la durée du traitement sont précisées.
<b>Numérateur</b>	Nombre de dossiers dont le traitement de sortie comporte des BZD pour lesquels sont précisées la posologie et la durée de ce traitement
<b>Dénominateur</b>	Nombre de dossiers dont le traitement de sortie comporte des BZD inclus
<b>Critères d'exclusion</b>	Patients ayant fugués
<b>Type d'indicateur</b>	Indicateur de processus.
<b>Recommandations</b>	<p>« Les benzodiazépines sont aujourd'hui le traitement médicamenteux de première intention du syndrome de sevrage alcoolique. C'est pour cette classe de médicaments que l'effet thérapeutique a été le mieux démontré. Les BZD réduisent l'incidence et la sévérité du syndrome de sevrage, de crises comitiales et du DT. Les BZD à demi-vie longue comme le diazépam préviennent mieux les crises comitiales. Les BZD à demi-vie brève présentent un potentiel d'abus plus élevé. La durée du traitement par benzodiazépines, prescrites à doses dégressives, ne doit pas excéder 7 jours sauf complication. La prescription personnalisée est à développer. [...] Les BZD réduisent l'incidence et la sévérité du syndrome de sevrage, des crises comitiales et du delirium tremens. » - ANAES&amp;SFA. Objectifs, indications et modalités du sevrage du patient alcoolodépendant. Conférence de consensus. Paris: Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé &amp; Société française d'alcoologie; 1999 17 mars</p> <p>« Chez une personne dépendante qui se retrouve en situation de sevrage contraint à l'occasion d'une hospitalisation pour des raisons autres qu'addictologies, un traitement médical symptomatique doit être instauré, par exemple : posologie adaptée de benzodiazépines (BZD) chez l'utilisateur dépendant des BZD ainsi que chez l'utilisateur dépendant de l'alcool » - SFA. Sevrage alcoolique chez un patient consommant des BZD. Evaluation des pratiques professionnelles en alcoologie: Référentiel de bonnes pratiques cliniques. Paris: Société française d'alcoologie; 2006 Décembre.</p> <p>« Il est admis que le sevrage des BZD ne doit pas être brutal (sauf exceptions qui imposent des protocoles spécifiques), il est long et complexe » - Badin De Montjoye B, Podevin P. Le sevrage alcool. Le Courrier des addictions. 2009;11(1):31-2.</p>
<b>MODE D'EVALUATION DE L'INDICATEUR</b>	
Recueil rétrospectif sur dossier	
Pour chaque dossier est recherché l'ensemble des éléments demandés dans le dossier. L'indicateur est la moyenne des dossiers.	

## Algorithme de calcul

Proportion de patients ayant fait un sevrage de l'alcool durant leur hospitalisation pour lesquels lorsque le traitement de sortie comporte des benzodiazépines (BZD), la posologie et la durée du traitement sont précisées.

Variable	Algorithme				
Pourcentage de dossiers  $= \sum_{i=1}^{60} [\text{num IND BENZO}] / \sum_{i=1}^{60} [\text{den IND BENZO}]$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;">               Dossier i :                 [num IND BENZO]             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">               Si [BENZO 1.2] = « Oui »                Et [BENZO 1.3] = « Oui »                Alors                    [num IND BENZO] = 1                Sinon                    [num IND BENZO ] = 0                FinSi             </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: top;">               Dossier i :                 [den IND BENZO]             </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">               Si [BENZO 1.1] = « Oui »                Alors                    [den IND BENZO] = 1                FinSi             </td> </tr> </table>	Dossier i :  [num IND BENZO]	Si [BENZO 1.2] = « Oui » Et [BENZO 1.3] = « Oui » Alors [num IND BENZO] = 1 Sinon [num IND BENZO ] = 0 FinSi	Dossier i :  [den IND BENZO]	Si [BENZO 1.1] = « Oui » Alors [den IND BENZO] = 1 FinSi
Dossier i :  [num IND BENZO]	Si [BENZO 1.2] = « Oui » Et [BENZO 1.3] = « Oui » Alors [num IND BENZO] = 1 Sinon [num IND BENZO ] = 0 FinSi				
Dossier i :  [den IND BENZO]	Si [BENZO 1.1] = « Oui » Alors [den IND BENZO] = 1 FinSi				