

Message de la DRASS ALSACE (18/12/2008) :

Communiqué aux médecins généralistes et ophtalmologistes:

Plusieurs cas de Kérato-conjonctivites virales Signalés dans la région

La DRASS vous informe que plusieurs cas de kérato-conjonctivites d'origine virale ont été pris en charge durant ces derniers jours par un cabinet d'ophtalmologistes de la région. **Ces kérato-conjonctivites sont extrêmement contagieuses** et ont pour cause le plus souvent un adénovirus. La prise en charge en consultation de ces patients peut entraîner la transmission du germe par contact à d'autres patients, par l'intermédiaire des surfaces, des dispositifs médicaux, du personnel soignant ou des médecins. **Ce germe n'est pas éliminé par un lavage simple des mains** et il est nécessaire donc de bien appliquer les mesures d'hygiène de base entre chaque patient, notamment en **se désinfectant les mains à l'aide de solutions hydroalcooliques (SHA) virucides.**

Les recommandations suivantes sont proposées par le C-CLIN Ouest :

- Placer tous les patients infectés avec un germe épidémique en isolement contact pendant une période adaptée* ;
- Mettre en arrêt de travail les personnels soignants (y compris les médecins) pendant la durée de leur infection (au moins 5 jours) ;
- Porter des gants à usage unique lors de tous soins chez un patient infecté ;
- Effectuer une désinfection des mains à l'aide de solutions hydroalcooliques (SHA) ou un lavage antiseptique hygiénique des mains (avec un savon antiseptique) avant et après tout soin (y compris après l'ablation des gants lors de l'utilisation de gants) ;
- Nettoyer et stériliser ou désinfecter de manière appropriée les dispositifs médicaux en contact avec l'œil (notamment les tonomètres) ;
- Utiliser des solutions ophtalmiques à usage unique chez les patients infectés ;

- Une attention particulière devra être portée au niveau des cabinets médicaux sur la désinfection des locaux utilisés par ces patients (les adénovirus peuvent persister sur surfaces en métal ou en plastique pendant plus de 30 jours), en n'oubliant les objets fréquemment manipulés (journaux, jouets en plastiques, poignées de porte, etc...).

Ces mesures sont rappelées dans le guide

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_de_bonnes_pratiques_pour_la_prevention_des_infections_liees_aux_soins_realises_en_dehors_des_etablissemnts_de_sante.pdf

*La notion d'isolement contact est bien définie au niveau hospitalier. En ambulatoire, elle va reposer sur des conseils donnés au patient avec par exemple :

- la prescription de SHA explications sur leur utilisation,
- des recommandations de ne partager ni les serviettes en tissus, ni le savon de toilette, ni les lunettes de vue ou de soleil, ni les collyres,
- de désinfecter régulièrement les poignées de porte, etc...

Merci de **signaler à la DDASS de votre département** la constatation de cas groupés de kérato-conjonctivite et les difficultés que vous pourriez rencontrer.