

Thème	Indicateurs	Points	Conditions	Info	Montant
Organisation du cabinet 66% de télétrans obligatoire	Mise à disposition d'un justificatif comportant un descriptif de l'équipement permettant la tenue du dossier médical informatisé et la saisie de données cliniques pour le suivi individuel et de la patientèle	75		Médecin	525 €
	Mise à disposition d'un justificatif témoignant de l'utilisation d'un logiciel d'aide à la prescription certifié	50		M	350 €
	Mise à disposition d'un justificatif d'équipement informatique permettant de télétransmettre et d'utiliser des téléservices	75		M	525 €
	Affichage dans le cabinet et sur le site ameli des horaires de consultations et des modalités d'organisation du cabinet, notamment pour l'accès adapté des patients	50		M	350 €
	Elaboration à partir du dossier informatisé, et mise à disposition, d'une synthèse annuelle par le médecin traitant pour ces patients	150		M	1 050 €
Pathologies chroniques	Nombre de patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « médecin traitant » (MT) et bénéficiant de 3 à 4 dosages d'HbA1c dans l'année parmi l'ensemble des patients traités par antidiabétiques ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».	30	≥ 65%	Caisse	210 €
	Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d'HbA1c sont < 8,5 % parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».	15	≥ 90%	M	105 €
	Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats de dosages d'HbA1c sont < 7,5 % parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».	25	≥ 80%	M	175 €
	Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est ≤ 1,5 g/l parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».	10	≥ 90%	M	70 €
	Nombre de patients MT diabétiques de type 2 dont les résultats du dosage de LDL cholestérol est ≤ 1,3 g/l parmi l'ensemble des patients diabétiques de type 2 ayant choisi le médecin comme « médecin traitant ».	25	≥ 80%	M	175 €
	Nombre de patients MT traités par antidiabétiques et bénéficiant d'une consultation ou d'un examen du fond d'œil ou d'une rétinographie dans les deux ans rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antidiabétiques	35	≥ 80%	C	245 €

	Nombre de patients MT traités par antidiabétiques dont l'âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines parmi l'ensemble des patients MT de mêmes tranches d'âge traités par antidiabétiques et antihypertenseurs	35	≥75%	C	245 €
	Nombre de patients MT diabétiques dont l'âge est > 50 ans pour les hommes et > 60 ans pour les femmes et traités par antihypertenseurs et statines et bénéficiant d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant, rapporté à l'ensemble des patients MT diabétiques de mêmes tranches d'âge traités par antihypertenseurs et statines	35	≥ 65 %	C	245 €
	Nombre de patients MT traités par antihypertenseurs dont la pression artérielle est à 140/90 mm Hg, rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antihypertenseurs	40	≥ 60 %	M	280 €
Prévention	Nombre de patients MT âgés de 65 ans ou plus vaccinés grippe, rapporté à l'ensemble des patients MT de 65 ans ou plus	20	≥ 75 %	C	140 €
	Nombre de patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination grippe et vaccinés, rapporté à l'ensemble des patients MT âgées de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne de vaccination	20	≥ 75 %	C	140 €
	Nombre de patientes MT de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein rapporté au nombre de femmes MT de 50 à 74 ans	35	≥ 80 %	C	245 €
	Nombre de patients MT âgés de plus de 65 traités par vasodilatateurs, rapporté au nombre des patients MT âgés de plus de 65 ans	35	≤ 5 %	C	245 €
	Benzodiazépines à demi vie longue : Nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans traités, rapporté au nombre de patients MT âgés de plus de 65 ans	35	≤ 5 %	C	245 €
	Durée de traitement par benzodiazépines : Nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD à partir du 01/01/2012 et d'une durée supérieure à 12 semaines, rapporté au nombre de patients MT ayant débuté un traitement par BZD sur la même période.	35	≤ 12 %	C	245 €
	Cancer du col de l'utérus : Nombre de patientes MT de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années, rapporté à l'ensemble des patientes MT de 25 à 65 ans	35	³ 80 %	C	245 €
	Antibiothérapie : Nombre de traitements par antibiotiques pour les patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD rapporté au nombre de patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD	35	≤ 37	C	245 €

Efficienc	Antibiotiques : Prescription (en nombre de boîtes) d'antibiotiques dans le répertoire des génériques/l'ensemble des antibiotiques prescrits (en nombre de boîtes)	60	≥ 90%	C	420 €
	Inhibiteurs de la pompe à protons Prescription (en nombre de boîtes) des IPP dans le répertoire des génériques/l'ensemble des IPP prescrits (en nombre de boîtes)	60	≥ 85%	C	420 €
	Prescription (en nombre de boîtes) des statines dans le répertoire des génériques/l'ensemble des statines prescrites (en nombre de boîtes)	60	≥ 70%	C	420 €
	Prescription (en nombre de boîtes) des antihypertenseurs dans le répertoire des génériques/l'ensemble des antihypertenseurs prescrits (en nombre de boîtes)	55	≥ 65%	C	385 €
	Prescription (en nombre de boîtes) des antidépresseurs dans le répertoire des génériques/l'ensemble des antidépresseurs prescrits (en nombre de boîtes)	55	≥ 80%	C	385 €
	Prescription (en nombre de boîtes) d'IEC/l'ensemble des IEC + sartans prescrits (en nombre de boîtes)	55	≥ 65%	C	385 €
	Nombre de patients MT traités par aspirine à faible dosage, rapporté à l'ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires	55	≥ 85%	C	385 €
	Total	1300			9 100 €
	Maximum obtenu par renseignement par le médecin				3 605 €
	Maximum obtenu par renseignement par la caisse				5 495 €