GUIDE D'UTILISATION DES PANSEMENTS DES PLAIES CHRONIQUES SELON L'ASPECT DE LA PLAIE ET L'IMPORTANCE DE L'EXSUDAT

Aspect de la plaie	Exsudat	Type de pansements		Rythme de réfection des pansements
		Classes	Exemples de produits disponibles	
Nécrotique	♦♦	Alginate	Algostéril®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb®	1-2 jours
	0 à ♦	Tulle neutre + Vaseline	Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell® + Codexial Vaseline®	"
	0	Hydrogel	Purilon Gel®, Hydrosorb Gel®	"
Fibrineux	♦♦	Alginate	Algostéril®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb®	1-2 jours
	0 à ♦	Tulle neutre	Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell®	"
	0	Hydrogel	Purilon Gel®, Hydrosorb Gel®	"
Bourgeonnant	♦♦♦	Hydrofibre	Aquacel®	1-4 jours
	♦ à ♦♦	Hydrocellulaire	Allevyn®, Tielle®, Mepilex®, Biatin®	1-4 jours
	♦	Hydrocolloïde mince	Comfeel Plus Transparent®, DuoDerm Extra-mince®	2-7 jours
	0 à ♦	Interface	Adaptic®, Urgotul®, Mepitel®, Physiotulle®	2-4 jours
	0 à ♦	Tulle neutre	Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell®	1-2 jours
	0 à ♦	Film de polyuréthane	Tegaderm®, Hydrofilm®, Opsite Flexigrid®	2-7 jours
Hyperbourgeonnant	0 à ♦	Dermocorticoïde + Interface ou Tulle neutre	Diprosone crème® + Adaptic®, Mepitel®, Physiotulle® ou Vaselitulle®, Jelonet®, Tulle Gras®, Lomatuell®	1-2 jours
En voie d'épidermisation	♦	Hydrocolloïde mince	Comfeel Plus Transparent®, DuoDerm Extra-mince®	2-7 jours
	0 à ♦	Film de polyuréthane	Tegaderm®, Hydrofilm®, Opsite Flexigrid®	"
	0 à ♦	Interface	Adaptic®, Urgotul®, Mepitel®, Physiotulle®	"
Malodorant	♦♦ à ♦♦♦	Pansement au charbon + Alginate	Carboflex®, Actisorb Plus®, Askina Carbosorb®, Alione® + Algostéril®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb®	1-2 jours
Infecté	♦♦♦	Pansement à l'argent	Aquacel Ag®	1-2 jours
	♦♦		Release Ag®	"
	♦ à ♦♦		BiatinAg®, Cellosorb Ag®	"
Hémorragique	♦♦ à ♦♦♦	Alginate	Algostéril®, Urgosorb®, Seasorb®, Askina Sorb®	1-2 jours

Commentaires :

- Importance de l'exsudat de la plaie : très exsudatif : ♦♦♦
  moyennement exsudatif : ♦♦
  peu exsudatif : ♦
  nul : 0
- La liste des produits disponibles cités n'est pas exhaustive. Les pansements hypoallergéniques ont été privilégiés.
- Les hydrocolloïdes, les interfaces et les tulles neutres sont contre-indiqués dans les plaies des pieds diabétiques.
- L'Urgotul® est contre-indiqué dans les plaies hyperbourgeonnantes.
- Les plaies malodorantes sont généralement très exsudatives, il est donc nécessaire d'associer le pansement au charbon à un alginate.

VK, novembre 2008