

## COMMENT RÉALISER UNE INJECTION VACCINALE INTRA-MUSCULAIRE


HAS Décembre 2020

### IV.3.c. Injection vaccinale

- Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.
- Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse imbibée d'antiseptique cutané de préférence alcoolique.
- Prendre la seringue pré remplie de vaccin.
- Purger l'aiguille et chasser la bulle d'air de la seringue.
- **Faire un pli cutané entre le pouce et l'index.**
- Injecter le vaccin par voie intramusculaire :
  - Piquer perpendiculairement au plan cutané
  - Tirer légèrement sur le piston pour vérifier que l'aiguille n'est pas dans un vaisseau sanguin
  - Pousser lentement sur le piston pour délivrer la dose entière de vaccin
- Comprimer le point d'injection avec une compresse et appliquer un pansement.
- Evacuer la seringue et l'aiguille dans le collecteur à objets perforants.
- Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.
- Enregistrer l'acte vaccinal avec le nom du vaccin, le numéro de lot, le jour et l'heure de l'administration au patient dans VACCIN COVID et dans le dossier de l'utilisateur.
- Rappeler à la personne qu'une 2<sup>ème</sup> injection devra être réalisée dans 21 jours.

HAS Janvier 2021

## B• INJECTION VACCINALE

Qui	Instruction
 Médecin : Infirmier	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.</li><li>2. Désinfecter la région deltoïdienne avec une compresse imprégnée d'un produit antiseptique alcoolique ou d'alcool à 70°.</li><li>3. Prendre la seringue pré remplie de vaccin Cominarty®.</li><li>4. Injecter le vaccin par voie intramusculaire :<ol style="list-style-type: none"><li>a. <b>Tendre fermement la peau entre l'index et le pouce sans faire de pli cutané</b></li><li>b. Enfoncer l'aiguille d'un mouvement sûr et rapide perpendiculairement au plan cutané et ne pas aspirer</li><li>c. Injecter la dose entière de vaccin Cominarty®</li></ol></li><li>5. Comprimer le point d'injection avec une compresse et appliquer un pansement.</li><li>6. Evacuer la seringue et l'aiguille dans le collecteur à objets perforants.</li><li>7. Effectuer une hygiène des mains avec un produit hydro-alcoolique.</li><li>8. Enregistrer l'acte vaccinal avec le nom du vaccin, le numéro de lot, le jour et l'heure de l'administration au patient dans Vaccin Covid et dans le dossier de l'utilisateur</li><li>9. Rappeler à la personne qu'une 2<sup>ème</sup> injection devra être réalisée dans 21 jours.</li></ol>