

Effets indésirables fréquents (>10%) recensés du baclofène (2013 LEGAY HOANG Léa)

Tableau 1 : Effets indésirables en fonction de la dose de baclofène prescrite

	% (n)	Permanents	< 90 mg	90-120 mg	120-180 mg	>180 mg
Somnolence	45 % (52)	49 %	48 %	13 %	27 %	12 %
Coup de barre	29 % (30)	40 %	37 %	17 %	26 %	20 %
Fatigue	23 % (27)	57 %	48 %	15 %	26 %	11 %
Insomnie	20% (23)	52 %	35 %	17 %	26 %	22 %
Vertige	20% (23)	35 %	56 %	13 %	22 %	9 %
Céphalées	13 % (15)	33 %	40 %	20 %	27 %	13 %
Mémoire	12 % (14)	64 %	50 %	7 %	22 %	21 %
Tb concentration	11 % (13)	46 %	46 %	0 %	31 %	23 %
Excitation	11 % (13)	53 %	62 %	0 %	23 %	15 %
Modification libido	10 % (11)	55 %	64 %	9 %	27 %	0 %
Transpiration	10 % (11)	91 %	18 %	0 %	65 %	18 %
Nausée	10 % (11)	55 %	64 %	18 %	18 %	0 %

Tableau 2 : conséquences des effets secondaires sur la poursuite du traitement

	%(n)	Permanents	Arrêt du traitement	Limitation augmentation posologie	Aucune modification du traitement	Introduction d'un traitement symptomatique
Somnolence	45 % (52)	49 %	10 %	42 %	4 %	44 %
Coup de barre	29 % (30)	40 %	7 %	43 %	7 %	43 %
Fatigue	23 % (27)	57 %	15 %	41 %	3 %	41 %
Insomnie	20% (23)	52 %	4 %	39 %	52 %	4 %
Vertige	20% (23)	35 %	26 %	4 %	13 %	57 %
Céphalées	13 % (15)	33 %	13 %	0 %	27 %	60 %
Mémoire	12 % (14)	64 %	36 %	43 %	7 %	14 %
Tb concentration	11 % (13)	46 %	23 %	54 %	8 %	15 %
Excitation	11 % (13)	53 %	0 %	8 %	0 %	92 %
Modification libido	10 % (11)	55 %	0 %	0 %	0 %	100 %
Transpiration	10 % (11)	91 %	9 %	9 %	9 %	73 %
Nausée	10 % (11)	55 %	36 %	37 %	0 %	27 %